



ul. Słowackiego 33
22-100 Chełm
tel.: 82 565 47 12
pon. - pt. w godz. 8-18

Przygotowanie do kolonoskopii.

Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie jelita grubego do badania prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń. O wyborze jednego z poniższych schematów powinien zdecydować lekarz.

Schemat przygotowania preparatem FORTRANS:

- Na trzy dni przed planowaną kolonoskopią nie należy spożywać sałatek jarzynowych, owoców pestkowych (np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek) oraz pestek siemienia lnianego i maku.
- W dniu poprzedzającym badanie można zjeść tylko śniadanie, bez mleka, surowych owoców i warzyw oraz napojów gazowanych. Można spożywać zupy w formie zmiksowanej (zupa krem), kisiel, budyń, serki homogenizowane bez dodatków. Inne napoje można pić w dowolnej ilości.
- Na badanie proszę zgłosić się z osobą towarzyszącą oraz ewentualnie z posiłkiem, który będzie można spożyć po badaniu.
 - W razie pytań, prosimy dzwonić.
 - Koniecznym jest także o powiadomienie nas, jeśli zrezygnujecie Państwo z badania, co najmniej dwa dni przed zarejestrowanym badaniem.

Do badania kolonoskopowego całe jelito powinno być bardzo oczyszczone.

W tym celu należy zastosować środek przeczyszczający FORTRANS (4 saszetki) i środek przeciwwzdęciowy ESPUMISAN EASY (4 saszetki). Leki te są dostępne w większości aptek.

Wariant pierwszy- badanie będzie wykonane rano (przed godz. 12:00).

W dniu poprzedzającym badanie należy zjeść tylko „lekkie” śniadanie. Koło południa (ok. godz. 12:00-14:00) należy przygotować 4 litry roztworu Fortrans-u. W tym celu należy rozpuścić każdą z 4 torebek Fortrans-u w 1 litrze wody. Dla smaku można dodać soku cytrynowego. Przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 4-6 godzin (1 szklanka co 15-20 min.).

Przed wypiciem każdej saszetki Fortnasu należy połknąć 1 saszetkę Espumisanu Easy. Następnie można jeszcze wypić dowolną ilość niegazowanej, czystej wody. W dniu badania nie wolno nic jeść, można pić niegazowaną wodę, zgodnie z odczuwalnym pragnieniem.

Picie wody należy zakończyć na 6 godzin przed badaniem.

Wariant drugi- badanie będzie wykonane po południu (po godz. 12:00).

W dniu poprzedzającym badanie należy zjeść normalne śniadanie. Nie wolno jeść obiadu. Po południu (ok. godz. 15:00-17:00) należy przygotować 2 litry roztworu Fortrans-u. W tym celu należy rozpuścić 2 torebki Fortrans-u w 2 litrach niegazowanej wody. Dla poprawy smaku można dodać soku cytrynowego. Przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 2-3 godzin (1 szklanka co 15-20 min.). Przed wypiciem każdej saszetki Fortransu należy połknąć 1 saszetkę Espumisanu Easy. W dniu badania rano (ok. godz. 6:00-8:00) należy przygotować kolejne 2 litry roztworu Fortrans-u.

W tym celu należy wypić w ciągu 2-3 godzin (1 szklanka co 15-20 min.). Przed wypiciem każdej saszetki Fortransu należy połknąć 1 saszetkę Espumisanu Easy. Do chwili badania nie należy nic jeść, można pić niegazowaną, czystą wodę, zgodnie z odczuwalnym pragnieniem. Picie wody należy zakończyć na 6 godzin przed nadaniem.